DOUCET
20845/P

MÉMOIRE

SUR

LA MALADIE

Qui a attaqué, en différens temps, les Femmes en couche, à l'Hôtel-Dieu de Paris.

IX.

J. xxxiii
18

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30378461

S0427

MÉMOIRE

SUR

LA MALADIE

Qui a attaqué, en différens temps, les Femmes en couche, à l'Hôtel-Dieu de Paris.

Lû dans une des Assemblées de la Faculté de Médecine de Paris, dites *Prima-mensis;*

SUIVI

D'un Rapport, fait par ordre du Gouvernement, sur le même sujet; avec des réflexions sur la nature & le traitement de la *Fièvre puerpérale.*

Lû dans la Séance de la Société Royale de Médecine, tenue au Louvre le 6 Septembre 1782.

(*Sur l'Imprimé, à PARIS.*)

M. DCC LXXXIII.

WELLCOME
LIBRARY
INSTITUTE

MÉMOIRE

SUR

LA MALADIE

Qui a attaqué, en différens temps, les Femmes en couche, à l'Hôtel-Dieu de Paris.

Lû à l'une des assemblées de la Faculté de Médecine, dites *Prima-mensis.*

LA Maladie terrible qui fait le sujet de ce Mémoire, & dont nous allons tracer tous les symptômes avec l'exactitude nécessaire, pour que l'on puisse la reconnoître facilement, s'est montrée à l'Hôtel-Dieu de Paris à différentes époques, & a toujours paru y régner épidémiquement. On remarque seulement que depuis un certain nombre d'années les retours en sont fréquens.

Les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, pour l'année 1746, contiennent des Observations faites dans la Ville, par *Antoine de Jussieu*; & à l'Hôtel-Dieu, par *Coi de-Villard*, & par *Fontaine*,

Médecins de cet Hôpital, ſur une Maladie qui, quoique différente eu égard à quelques-uns de ſes ſymptômes, étoit très-ſemblable dans ſes effets, ainſi que le confirme l'ouverture des cadavres.

Depuis ce temps, une des époques où elle a été le plus fâcheuſe, eſt la fin de l'année 1774. On l'a plus ou moins obſervée tous les ans depuis. Il étoit temps que la Médecine vînt à bout de la guérir. Les ravages qu'elle occaſionnoit ſi fréquemment, préſentoient le tableau le plus affligeant pour l'humanité. Eſt-il en effet un ſpectacle plus déchirant ? eſt-il une poſition plus triſte pour le Médecin que de voir tous les jours périr, malgré ſes ſoins les plus ardens & les plus empreſſés, un certain nombre de Femmes en couche, ſans jamais avoir la conſolation d'en ſauver une ſeule ! Nous avons vu M. *Doulcet*, entr'autres, qui eſt enfin parvenu à guérir cette affreuſe maladie, renoncer à ſoigner ces malheureuſes Femmes, n'y pouvoir plus tenir, quitter ce département avant l'expiration de ſon temps, prier un de ſes Confrères de le faire à ſa place, &, rebuté de n'y pouvoir faire le bien, l'échanger pour le plus pénible de l'Hôtel-Dieu.

Quoique cette maladie ait été ſouvent obſervée à l'Hôtel-Dieu, ſur-tout depuis quelques années, il ne faut pas croire qu'elle n'ait lieu que dans cette Maiſon. Outre ce que nous venons de dire

d'*Antoine de Jussieu* qui l'avoit vue dans Paris en 1746 (*a*), des Observations bien faites & multipliées prouvent inconteſtablement que la Ville n'en eſt pas exempte, & qu'elle y a toujours été également meurtrière. Sans parler de celles faites tout récemment par les Médecins de l'Hôtel-Dieu, ſur trois Femmes *accouchées en ville*, frappées de cette maladie au moment de la révolution du lait, tranſportées audit Hôpital pour y être ſoignées, & placées toutes les trois dans des Salles différentes. (Obſervations que nous avons déjà miſes ſous les yeux de l'Adminiſtration) Nous pourrions en citer beaucoup d'autres recueillies en différens temps, & par les Médecins de l'Hôtel-Dieu, en état de la bien diſtinguer, & par les Anteurs (*b*) qui ont écrit ſur les maladies des Femmes en couche : & enfin, par les Médecins Anglois qui ont donné le nom de *Fièvre puerpérale* à une maladie également produite par un épanchement laiteux dans le bas-ventre.

Ajoutons qu'il eſt très-poſſible qu'en France cette maladie ait été pour l'ordinaire méconnue,

---

(*a*) Voyez les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *année 1746*. Hiſtoire des Maladies Épidémiques, par *Malouin*, *page 60*.

(*b*) Nous rapporterons plus bas une Obſervation, entr'autres de *Puzos*, qui offre des faits très-analogues à ceux dont il eſt queſtion.

parce que d'une part les ouvertures de cadavres y ſont en général rares, & que d'autre part les Médecins, ſeuls en état de bien caractériſer une maladie, ne ſont point communément appelés auprès des Femmes en couche, ſur-tout pendant les premiers jours, & que la mort arrive toujours au plus tard le ſeptième. Il y a donc lieu de croire que les Sages-Femmes & le commun des Accoucheurs ont regardé cette maladie comme une inflammation de bas-ventre ordinaire, avec laquelle elle a effectivement quelques rapports groſſiers, & que le traitement des inflammations de bas-ventre, qui conſiſte en ſaignées, en boiſſons rafraîchiſſantes, en fomentations émollientes, &c. employé dans ces cas particuliers, a fait perdre un temps précieux. La confiance que l'on a eue en ces ſecours, eſt cauſe que l'on a différé d'en rechercher de plus efficaces de la part de ceux qui auroient pu mieux connoître le genre de la maladie, & les Femmes qui y ſuccombent très-promptement, ſont mortes avant qu'on ait ſeulement ſongé à y recourir.

Deſcription de la Maladie.

L'ÉTAT des Femmes que nous avons vu attaquées de cette maladie ne préſente rien, pendant le cours de leur groſſeſſe, après même leur accouchement, ordinairement heureux, qui puiſſe faire

ſoupçonner qu'il aura des ſuites auſſi cruelles. Tout ſe paſſe à merveille juſqu'au troiſième jour, époque fatale à laquelle ſe déclarent les ſymptômes les plus alarmans. Pour les décrire avec ordre, & pour apprendre à bien diſtinguer cette eſpèce particulière, nous les diviſerons en ſymptômes toujours exiſtans ; c'eſt-à-dire, communs à toutes les Femmes attaquées, & en ſymptômes que l'on remarque ſouvent, ou ſeulement particuliers à un certain nombre. L'on ſent aiſément que ce ſont les premiers qu'il eſt le plus important de bien ſaiſir.

Nous avons dit que les premiers indices du mal ſe manifeſtoient le troiſième jour, c'eſt le plus ordinaire ; ils ont cependant eu lieu plutôt, & même quelques heures après l'accouchement.

* Quel que ſoit l'inſtant de leur apparition, tout-à-coup il ſe déclare une fièvre ſenſible, mais non pas très-forte ; le pouls eſt petit, concentré & un peu accéléré ; les ſeins ſe flétriſſent à l'inſtant, au lieu d'augmenter de volume, ainſi qu'il devroit arriver à cette époque ; le ventre ſe météoriſe, & devient exceſſivement douloureux, ſans qu'il y ait aucune diminution des lochies qui continuent à bien couler. Tels ſont les ſymptômes qui conſtituent eſſentiellement la maladie,

* Symptômes toujours exiſtans.

& qui ſont communs à toutes les Femmes, auxquels on peut ajouter l'abattement des forces.

* A ceux-là ſe joignent quelquefois, & avec beaucoup de variété, ſuivant les différentes Malades, les ſymptômes ſuivans : 1°. un friſſon plus ou ou moins violent qui ſe déclare dans le principe ; 2°. des vomiſſemens de matières vertes, ou légérement teintes de jaune, & plus fréquemment encore de ſimples nauſées ſans vomiſſemens ; 3°. un dévoiement laiteux & très-fétide ; 4°. les yeux s'éteignent ; 5°. le viſage ſe décolore ; 6°. enfin, la langue eſt ordinairement humide & chargée d'un limon blanc aſſez épais, quelquefois d'un jaune verdâtre à ſa baſe.

Progrès de la Maladie.

AVANT d'achever le tableau de cette Maladie, il eſt bon de dire que c'eſt à ce premier inſtant que le traitement, que nous détaillerons plus bas, doit être adminiſtré. Quelques heures plus tard, pour l'ordinaire, il n'eſt plus temps.

Aux ſymptômes que nous venons de décrire, aucun autre ne vient ſe joindre, du moins pendant les premières heures. On obſerve ſeulement qu'ils augmentent d'intenſité ; le pouls devient de plus en plus petit & concentré, les ſeins reſtent flaſques,

* Symptômes particuliers.

la révolution du lait n'a aucunement lieu, & les douleurs de bas-ventre, dont la tenſion augmente, deviennent intolérables : mais bientôt, c'eſt-à-dire, vers la fin du ſecond jour de la maladie, ou dans le courant du troiſième elles diminuent, pour même ceſſer quelquefois tout-à-fait. Calme perfide! Souvent ſuccède une petite ſueur froide & gluante ; les évacuations par les ſelles & les vidanges ſont d'une fétidité inſupportable; le pouls eſt tremblottant & miſérable ; la tête ſe perd, & les Malades ſuccombent à la fin du troiſième, ou au commencement du quatrième jour de la maladie, rarement avant, quelquefois un peu plus tard.

Ouverture des Cadavres.

Le nombre des victimes de cette maladie, avant que l'on eût employé le traitement qui actuellement guérit toutes celles qui en ſont attaquées, n'a que trop multiplié les occaſions de bien connoître ſes fâcheux effets dans l'économie animale.

Nous ne nous arrêterons pas à décrire l'état des parties ſolides du bas-ventre, que l'épanchement qui s'y forme, altère plus ou moins. Il nous ſuffira de dire, 1°. que cet épanchement eſt bien viſiblement de nature laiteuſe ; 2°. que nous ne pouvons en donner une plus juſte idée, qu'en le comparant

à du petit-lait non clarifié; 3°. qu'il eſt toujours très-fétide, & plus ou moins abondant; que nous en avons ſouvent vu deux & trois pintes; 4°. qu'il eſt dans la cavité propre de l'*abdomen*; 5°. qu'on y voit conſtamment flotter de gros morceaux de lait caillé, pour l'ordinaire fort blanc; 6°. qu'on en trouve en grand nombre de collés à la ſurface externe des inteſtins; 7°. enfin, que la matrice eſt abſolument dans l'état naturel.

Traitement indiqué par M. Doulcet, *& ſuivi du plus heureux ſuccès.*

Avant d'avoir mis en uſage la méthode très-ſimple que nous allons donner, la Médecine n'offre point de moyens qui n'aient été employés. Le défaut de ſuccès en rend le détail inutile. Cette cruelle maladie fut ſouvent l'objet de Conſultations faites, d'abord entre les Médecins de l'Hôtel-Dieu, & enſuite aux Aſſemblées de la Faculté, dites *Prima-menſis*. Il n'en réſulta toujours que des tentatives infructueuſes. L'ipécacuanha lui-même qui fait la baſe de la méthode actuelle, avoit ſouvent été donné ſans ſuccès dès l'année 1774, & l'on va voir à quoi cela tenoit.

Les remèdes rationnels intérieurs adminiſtrés avec la plus grande exactitude : les remèdes extérieurs, tels que les bains, les ſaignées du bras

& du pied, les véſicatoires, les ventouſes, l'application des ſangſues, les cataplaſmes anodins, toniques, vulnéraires, antiſeptiques, l'allaitement, la ſuccion des mamelons par des jeunes chiens, dans la vue de faire remonter le lait, les douches d'eau froide ſur le bas-ventre, que dans ce cas déſeſpéré on crut pouvoir tenter, enfin l'abſence totale de remèdes; tout étoit & devoit être également mortel, puiſque, quand bien-même il ne ſeroit pas au-deſſus de tous les efforts humains d'opérer la réſorption d'un fluide de cette nature, épanché dans la cavité du bas-ventre, il ſeroit toujours impoſſible d'opérer celle des morceaux de fromage qui s'y trouvent en abondance : réflexion déjà faite par *Puzos*, célèbre Accoucheur, qui, ayant ouvert une jeune Dame de condition, morte d'une maladie très-ſemblable à celle dont nous parlons, & attribuée à une frayeur qu'elle avoit eue, après avoir parlé d'une Conſultation qui fut faite par pluſieurs Médecins & Chirurgiens, du nombre deſquels étoit le fameux *Molin*, qui opina, ainſi que les autres, pour la ſaignée du pied, méconnoiſſant ſans doute la maladie, dit en propres termes, à la vue de cet épanchement de lait caillé : qu'*il n'y a point de moyens humains capables de prévenir un épanchement auſſi ſubit, & peut-être encore moins de diſſoudre une maſſe*

laiteuſe auſſi coagulée, & hors des routes de la circulation (*c*). Sans doute il n'en eſt point de diſſoudre une matière laiteuſe ainſi coagulée ; mais les obſervations répétées à l'Hôtel-Dieu ſur un grand nombre de Femmes, depuis la fin de l'année dernière, toutes arrachées à une mort juſqu'alors inévitable, prouvent qu'il en eſt de capables de prévenir l'épanchement, & que tout l'art conſiſtoit à le faire.

C'eſt dans cette vue, la ſeule qu'il ſoit poſſible de remplir, que M. *Doulcet*, préſent un jour au moment-même où une Femme nouvellement accouchée, reſſentit les premières atteintes de cette maladie, qui débuta chez elle par des vomiſſemens, ſaiſit promptement l'indication qui ſe préſentoit, la fit vomir à l'inſtant avec quinze grains d'ipécacuanha, qui lui furent donnés en deux doſes & répéta le vomitif le lendemain ; ayant alors obſervé une rémiſſion notable dans les ſymptômes, il ſoutint les déjections que cette ſeconde doſe procura, par une potion huileuſe avec addition de deux grains de kermès minéral, il prévint ainſi le dépôt qui menaçoit de ſe former, & il ſauva la Malade.

Inſtruit & encouragé par ce ſuccès, il ne tarda

(*c*) Pages 372 & 373, édition de 1759, par M. *Moriſot Deſlandes*, Médecin.

pas à reconnoître l'indiſpenſable néceſſité de mettre ce remède entre les mains de la Maîtreſſe Sage-Femme de l'Hôtel-Dieu, très-habile en ſon art, fort intelligente, zélée ſur-tout à un point qui mérite les plus grands éloges, & qui d'ailleurs n'a malheureuſement que trop appris à connoître l'invaſion de cette eſpèce de maladie. M. *Doulcet* lui recommanda ſpécialement de donner, ſans attendre ſon arrivée, l'ipécacuanha à toutes les Femmes qui éprouveroient les premiers ſymptômes de la maladie, le jour, la nuit, à quelqu'heure que ce fût. L'épidémie ſévit avec fureur, pendant plus de quatre mois à peine put-elle prendre un inſtant de repos, il fallut ſon courage pour réſiſter à la fatigue que lui donna une vigilance auſſi long-temps en action. Le ſuccès de ſes ſoins la ſoutint ſans doute ; près de deux cents Femmes, ainſi qu'il eſt prouvé, par le tableau de celles qui ont été attaquées de la maladie, & qu'il eſt facile de mettre ſous les yeux du Gouvernement, ont été rendues à la vie : on n'a perdu préciſément que celles (au nombre de cinq ou ſix) qui n'ont pas abſolument voulu prendre le remède, & dont on n'a pas pu vaincre l'opiniâtreté; elles ont été ouvertes, & l'on a reconnu l'épanchement laiteux, le lait caillé, & abſolument les mêmes déſordres que chez celles que cette même épidémie avoit fait périr les années précédentes. Il ſemble qu'elles n'ont refuſé le ſecours certain

qu'on leur offroit, que pour faire triompher la méthode de M. *Doulcet*, en mettre la certitude dans tout ſon jour, & ôter aux gens défians & aux envieux tout moyen de former des doutes même légers.

Dès la première apparition des ſymptômes, il faut donc ne pas perdre un inſtant, & adminiſtrer l'ipécacuanha à la doſe de quinze grains donnés en deux priſes, à une heure & demie d'intervalle : après l'effet de ce remède, paſſer tout de ſuite à l'uſage d'une potion huileuſe, compoſée de deux onces d'huile d'amandes douces, d'une once de ſirop de guimauve, & de deux grains de kermès minéral, que l'on fait prendre par cuillerée. Le lendemain, malgré la diminution des ſymptômes, il faut recommencer à donner l'ipécacuanha, & enſuite la potion, de la même manière, à plus forte raiſon, s'ils perſiſtent encore avec la même intenſité, ce qui eſt fort rare quand il a été donné à temps. On a quelquefois été obligé d'y recourir juſqu'à trois & quatre fois, lorſque le ventre reſtoit toujours météoriſé & douloureux, & que le pouls ne ſe relevoit pas.

La boiſſon doit être ſimple, telle, par exemple, qu'un eau de graine de lin ou de ſcorſonnère édulcorée avec le ſirop de guimauve ; & le ſept ou le huit de la maladie, on purge avec deux

onces

onces de manne & un gros de ſel *de duobus* ; médecine très-douce, qu'on réitère trois ou quatre fois, & que l'on rend plus active, s'il en eſt beſoin.

Parmi les émétiques, l'ipécacuanha paroît convenir de préférence. On peut dire que, par ſa qualité ſecondaire, tonique & ſubaſtringente, il empêche les vaiſſeaux lymphatiques de verſer dans la cavité de l'*abdomen* l'humeur laiteuſe qu'ils contiennent alors, en les reſſerrant convenablement ; ce qu'on attendroit en vain de tout autre vomitif. Ses effets ſont tels, qu'il mérite à juſte titre le nom de *ſpécifique* en ce cas, lorſqu'il eſt donné à temps, c'eſt-à-dire, avant la formation du dépôt qu'il prévient.

Quelques obſervations, rares à la vérité, & faites depuis l'emploi de la méthode indiquée, ont démontré qu'il falloit y recourir encore, lors même qu'on avoit perdu quelques heures, & que le vrai temps de donner l'ipécacuanha avec ſureté étoit paſſé. Un petit nombre d'événemens heureux en a juſtifié l'uſage en ces malheureuſes circonſtances.

La guériſon de la maladie s'opère ſans que la révolution du lait ait lieu, c'eſt-à-dire, que les ſeins ne ſe gonflent pas ſenſiblement, comme il arrive ordinairement le troiſième jour de la couche. Toute la matière laiteuſe eſt evacuée par

les ſelles, coule avec les vidanges, ou s'échappe par les voies de la tranſpiration & des urines.

Cette méthode n'a pas ſeulement réuſſi entre les mains de M. *Doulcet ;* elle a eu un égal ſuccès, adminiſtrée par M^rs. les Médecins de l'Hôtel-Dieu qui lui ont ſuccédé dans le département des Femmes en couche. Déjà ces Obſervations, infiniment précieuſes, ont été confirmées ſucceſſivement par trois de ſes Confrères, qui ſe ſont fait un devoir de ſuivre le plan qu'il avoit tracé. Il n'y ont fait que quelques additions que les circonſtances particulières ont exigé : additions qu'il eſt impoſſible de décrire, & dont les Médecins ſeuls peuvent reconnoître l'utilité.

Le traitement heureux d'une maladie qui fit ſi ſouvent le déſeſpoir de M^rs. les Adminiſtrateurs de l'Hôtel-Dieu, & dont toute la ſollicitude n'avoit pu arrêter les progrès, a mérité à M. *Doulcet* une Délibération de leur part, dont les expreſſions flatteuſes, garans de leur ſenſibilité, le ſont auſſi de l'importance de pareils ſuccès.

Mais ſans vouloir charger le tableau des malheurs occaſionnés par cette cruelle maladie, concluons que le ſervice rendu à l'Humanité par M. *Doulcet*, eſt inappréciable, qu'il eſt d'autant plus avantageux de publier la deſcription de cette maladie & ſon traitement, qu'elle n'eſt pas particulière à l'Hôtel-Dieu, ainſi que nous l'avons

démontré ; qu'au moyen du détail exact de ſes ſymptômes, que nous venons de donner, elle ne ſera plus méconnue, & qu'enfin le traitement qui lui eſt propre, étant rendu public, on aura la ſatisfaction de ſauver la vie à des Femmes, vouées auparavant à une mort certaine.

Signé DEJEAN, MAJAULT, MONTABOURG, DANIÉ, SOLIER, MALLET, DUHAUME, PHILIP, *Médecins-Penſionnaires de l'Hôtel-Dieu.*

LE Lundi 16 Septembre 1782, la Faculté de Médecine de Paris, aſſemblée pour traiter, ſuivant ſon uſage, des maladies règnantes ; Mrs. les Médecins de l'Hôtel-Dieu de Paris ont demandé à faire lecture d'un Mémoire, concernant une maladie depuis trop long-temps funeſte aux Femmes en couche, qui en étoient attaquées dans ledit Hôtel-Dieu. La Faculté les a accueillis avec empreſſement ; &, après avoir entendu ladite lecture, elle a arrêté unanimement, qu'attendu l'importance de ce Mémoire, & pour accélérer l'utilité dont il doit être dans la Ville & dans les Provinces, elle l'approuvoit, & ordonnoit qu'il fût imprimé le plutôt poſſible, préſenté aux premiers Magiſtrats, aux Miniſtres, aux

Administrateurs de l'Hôtel-Dieu, & distribué à chaque Docteur ; & que Mrs. les Médecins de l'Hôtel-Dieu, & les autres Membres de la Compagnie, seroient priés de rassembler leurs Observations particulières, & celles éparses dans les Auteurs, pour rendre cette Méthode aussi satisfaisante pour les Savans, que précieuse pour les Sujets du Roi; & c'est ainsi que j'ai conclu. Signé *PHILIP, Doyen.*

Et ont signé le présent Décret les deux plus anciens de chaque Ordre, MAJAULT, L. DE LAUREMBERTG, DESESSART, COUTAVOZ.

RAPPORT

FAIT PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT,

Sur un Mémoire contenant la Méthode employée par M. DOULCET, *Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, l'un des Médecins de l'Hôtel-Dieu, dans le Traitement d'une Maladie qui attaque les Femmes en couche, & que l'on connoît ſous le nom de* Fièvre puerpérale.

Lû dans la Séance de la Société Royale de Médecine, tenue au Louvre, le 6 Septembre 1782.

LE Mémoire ſur lequel la Société Royale de Medecine a été conſultée par le Gouvernement, & dont elle nous a chargés de lui rendre compte, contient la deſcription & le traitement d'une maladie qui a attaqué les Femmes en couche à l'Hôtel-Dieu de Paris, & qui a règné à différentes époques, & plus fréquemment que jamais depuis 1774. Feu M. *Doulcet*, Docteur-Régent de la Faculté de Paris & Médecin de l'Hôtel-Dieu, eſt parvenu à la guérir par une méthode très-ſimple, & dont le ſuccès, depuis qu'elle a été employée, ne s'eſt point encore démenti, quoique juſqu'alors cette maladie eût toujours été funeſte à toutes

les Femmes qui en avoient été atteintes dans cet Hôpital.

C'eſt ſouvent après les groſſeſſes les plus exemptes d'accidens, après les accouchemens les plus heureux, que cette maladie ſe déclare tout-à-coup, ſans qu'aucun ſymptôme précurſeur en ait annoncé le développement; elle paroît ordinairement le troiſième jour des couches, quelquefois plutôt, rarement plus tard; alors le ventre ſe météoriſe, devient exceſſivement douloureux, ſans aucune diminution des lochies qui continuent à couler; les ſeins qui devroient augmenter de volume, ſe flétriſſent, & en général la révolution du lait n'a point lieu. Les Malades ont une fièvre ſenſible, quoique peu forte; le pouls eſt petit, concentré, accéléré; les forces abattues. Ces premiers ſignes qui caractériſent eſſentiellement la maladie, ſont communs à toutes les femmes qui en ſont attaquées. A ceux-là ſe joignent ſouvent, mais moins conſtamment, pluſieurs autres ſymptômes : tels ſont un friſſon plus ou moins violent, qui ſe déclare dens le principe: des vomiſſemens de matière verte ou légérement teinte de jaune, & plus ſouvent encore, des nauſées ſans vomiſſement; un dévoiement laiteux & très-fétide; les yeux étincelans, le viſage décoloré. La langue eſt ordinairement humide, mais chargée d'un limon blanc, épais, & quelquefois d'un jaune verdâtre à la baſe.

Tous ces ſymptômes ont lieu dès le premier jour de la maladie ; ils s'aggravent promptement, & bientôt les douleurs de ventre deviennent intolérables. Cet état violent eſt remplacé, vers la fin du ſecond jour, par un calme trompeur, auquel ſuccèdent une ſueur froide & gluante, des ſelles & des vidanges d'une fétidité inſupportable, un pouls tremblottant & miſérable, le délire, enfin la mort, qui a lieu le plus ſouvent à la fin du troiſième jour, ou au commencement du quatrième.

L'ouverture des cadavres offre dans la cavité propre de l'*abdomen* juſqu'à deux & trois pintes d'un épanchement qu'on a jugé laiteux, ſemblable, pour toutes les apparences, à du petit-lait non clarifié, d'une odeur fétide, & qui contient des flocons de lait caillé, dont un grand nombre eſt collé à la ſurface des inteſtins. La matrice eſt dans l'état naturel.

Également rebelle aux efforts de l'Art & aux reſſources de la Nature, cette maladie rapide a conſtamment réſiſté aux remèdes les plus ſagement employés, ſoit pour prévenir l'inflammation, ſoit pour détourner l'humeur de deſſus les viſcères du bas-ventre, ſoit pour rappeler le cours du lait, ſoit pour combattre la putridité & pour procurer des évacuations ſalutaires. Tout a été tenté, tout a échoué. L'ipécacuanha même qui fait la baſe de

la méthode actuelle, n'a pas eu plus de ſuccès que les autres remèdes, juſqu'à ce que le haſard voulut que M. *Doulcet* fût préſent au moment même où cette maladie ſe déclaroit dans une Femme nouvellement accouchée. Elle débuta par des vomiſſemens ; auſſi-tôt M. *Doulcet*, ſaiſiſſant l'indication, ordonna quinze grains d'ipécacuanha, que la Malade prit en deux doſes, qui furent réitérées le lendemain. Le remède agit par haut & par bas ; les évacuations furent ſuivies d'une diminution notable de tous les ſymptômes ; on ſoutint les déjections par l'uſage d'une potion huileuſe, avec addition de deux grains de kermés, & la Malade fut ſauvée.

Éclairé par un ſuccès ſi inattendu, M. *Doulcet* ſentit l'importance du moment & la néceſſité de le ſaiſir, ſans laiſſer à l'engorgement le temps de ſe former tout-à-fait ; la Maîtreſſe Sage-Femme, aux ſoins de laquelle ſont confiées les Femmes en couche, fut chargée de l'adminiſtration de ce remède : jour & nuit, à quelque heure que les premiers ſymptômes de l'invaſion ſe fiſſent apercevoir, elle donnoit l'ipécacuanha : par-tout le ſuccès fut le même ; & en quatre mois, pendant leſquels l'épidémie régna avec fureur, près de de deux cents Femmes furent rendues à la vie ; cinq ou ſix ſeulement, qui toutes avoient refuſé de prendre le vomitif, furent les victimes de leur obſtination ; l'ouverture de leur corps ayant

préſenté les mêmes phénomènes que celles précédemment faites, ne laiſſa plus aucun doute ni ſur la nature de la maladie, ni ſur l'efficacité du remède.

Enfin, la méthode actuellement établie à l'Hôtel-Dieu, & qui ne s'eſt point démentie depuis qu'elle a été employée, conſiſte à ſaiſir le moment de l'invaſion, à donner alors, ſans perdre un inſtant, quinze grains d'ipécacuanha en deux doſes, à une heure & demie d'intervalle ; à réitérer le lendemain, ſoit que les ſymptômes ſoient diminués, ou qu'ils perſiſtent dans la même intenſité; & s'ils continuent encore, à répéter l'uſage du même remède juſqu'à trois & quatre fois, ſuivant leur opiniâtreté. Dans les intervalles, on ſoutient l'effet de l'ipécacuanha par une potion, compoſée de deux onces d'huile d'amandes douces, d'une once de ſyrop de guimauve & de deux grains de kermès minéral. La boiſſon ordinaire conſiſte dans une ſimple eau de graine de lin ou de ſcorſonnère, édulcorée avec le ſirop de guimauve; & vers le ſeptième & le huitième jour de la maladie, on fait prendre aux Malades une purgation douce, que l'on réitère trois ou quatre fois, ſelon que le cas l'exige.

C'eſt donc dans le choix du moment que conſiſte l'efficacité de cette méthode ; & quoique l'expérience ait démontré depuis, que la perte

de quelques heures n'étoit pas toujours irréparable, il eſt rare que paſſé le premier inſtant, l'ipecacuanha ait un ſuccès auſſi complet.

Ce qui mérite encore dans ce traitement une attention particulière, c'eſt que la guériſon s'opère ſans que la révolution du lait ait lieu. Les ſeins ne ſe gonflent pas, & toute la matière laiteuſe eſt évacuée par les ſelles, coule avec les vidanges, & ſort par la voie de la tranſpiration & des urines.

Si maintenant on conſidère avec attention les phénomènes que nous préſente cette maladie, & ceux qui accompagnent ſon traitement, il ſemble qu'elle conſiſte évidemment dans une métaſtaſe qui ſe fait ſur les viſcères du bas-ventre dans le temps où la révolution du lait devroit avoir lieu. C'eſt cette métaſtaſe qu'il eſt important de prévenir, & qui, une fois faite, eſt preſque toujours funeſte.

Cette maladie n'eſt ni nouvelle, ni particulière à l'Hôtel-Dieu.

Hippocrate en donne une deſcription parfaite dans ſon Livre *de Morbis mulierum*. *Wellis* en a publié dans le ſiècle dernier une très-bonne hiſtoire : Nous ne nous arrêterons point aux différens Auteurs qui ont parlé depuis, ſans s'en occuper d'une manière ſpéciale ; nous paſſerons à

des époques plus récentes. Mrs. *Col-de-Villars* & *Fontaine* l'ont vue en 1746 à l'Hôtel-Dieu de Paris ; & dans le même temps M. *Antoine de Jussieu* en traitoit de pareilles dans la Capitale. M. *Pouteau* l'observa en 1750 dans l'Hôtel-Dieu de Lyon ; il en a donné la description dans ses Mélanges de Chirurgie. On lit des Observations semblables dans les Ouvrages de Mrs. *Peu*, *Puzos*, *Levret*, & de plusieurs autres, mais c'est sur-tout depuis quelques années que les Anglois s'en sont occupés plus particulièrement. En 1768 & dans les années suivantes, elle a régné épidémiquement à Londres & dans plusieurs Contrées de l'Angleterre, où les Médecins lui ont donné le nom de *Fièvre puerpérale* ; elle étoit décrite très-au long dans les Ouvrages des Docteurs *Denman*, *Johnson*, *Milar*, *Manning*, *Home*, *Kirkland* & *Buttler*, & sur-tout dans ceux de Mrs. *White*, *Hulme* & *Leake*, & enfin dans les savantes Dissertations proposées à Edimbourg, par Mrs. *Johnstone* & *Slaughter*. A ce que ces Auteurs en on dit, nous joindrons des Observations qui nous ont été communiquées & qui ont été consignées en 1777 dans les registres du *Prima-mensis* de la Faculté de Médecine de Paris, par M. *Sigault*, qui a observé & traité cette maladie, dans le temps que M. *Solier*, témoin de ses ravages à l'Hôtel-Dieu de Paris, consignoit ses observations dans le même Recueil. M. *Doublet* a de même fait part à la

Faculté de Médecine de Paris de pluſieurs faits de la même nature, obſervés à l'Hôpital de Vaugigirard, depuis le mois de Novembre 1781, juſqu'à ce moment ; & M. *de la Roche*, Médecin de Genève, a lû à la Société Royale de Médecine un Ouvrage très-ſavant ſur la Fièvre puerpérale, qu'il a eu lieu d'obſerver dans ſa patrie.

Si l'on compare leurs deſcriptions à celle de la maladie obſervée à l'Hôtel-Dieu de Paris, on verra dans toutes, comme dans celle-ci, une invaſion ſubite, un gonflement douloureux du bas-ventre, accompagné de fièvre dans les premiers jours qui ſuivent l'accouchement ; par-tout, c'eſt une maladie très-dangereuſe, très-vive, très-meurtrière, ſouvent épidémique, & quelquefois contagieuſe ; par-tout le flux de ventre ſurvient tôt ou tard ; mais l'état des vidanges, la ſécrétion du lait, les organes affectés, l'état du pouls & des forces, & le caractère des humeurs ne ſont pas par-tout les mêmes.

Tous conviennent que les vidanges coulent quelquefois librement juſqu'à la fin de la maladie ; mais ils les ont vues ſouvent diminuées, ou totalement ſupprimées, au point que quelques-uns ont même regardé cette ſuppreſſion comme la cauſe de la maladie : Aſſez généralement la ſécrétion du lait ne ſe fait pas ; cependant les Auteurs Anglois ſur-tout, ne regardent pas ce ſymptôme

comme univerſel. Il eſt vrai qu'en général cette fonction eſt toujours plus ou moins altérée; & ſi l'on obſerve que tant dans les maladies de 1774, & enfin dans celles obſervées à Vaugirard par M. *Doublet*, les ſeins ont été conſtamment vides & flaſques, & que c'eſt au moment où ils devroient ſe remplir, que le ventre ſe météoriſe & s'engorge, il ſera difficile de croire que la révolution laiteuſe dérangée ne joue pas le rôle principal dans ces ſortes d'affections. Les Obſervations que M. *Doublet* a bien voulu nous communiquer, ſemblent le démontrer. Ce Médecin a remarqué que pluſieurs Nourrices de l'Hoſpice de Vaugirard, dans leſquelles la ſécrétion du lait avoit été dérangée par quelqu'accident, ont éprouvé des métaſtaſes ſur le bas-ventre, accompagnées des mêmes ſymptômes & des mêmes dangers que préſente la fièvre puerpérale, quoique pluſieurs ſemaines ſe fuſſent écoulées depuis l'accouchement. En général, il diviſe les fièvres puerpérales qu'il a obſervées en trois eſpèces. Les premières, qu'il nomme *éphémères*, qui ſont de peu de conſéquence, & qui ont lieu dans les premières vingt-quatre heures qui ſuivent l'accouchement, ne conſiſtent que dans un gonflement douloureux, mais paſſager, qui ſemble d'abord menacer le bas-ventre d'un metaſtaſe. Il eſt accompagné de fièvre, mais il ſe calme bientôt & cède à la révolution du lait qui diſſipe tous les

accidens. M. *Doublet* attribue cette première eſpèce à la lenteur avec laquelle le lait ſe porte aux mamelles. La ſeconde eſpèce eſt la fièvre puerpérale, proprement dite, la *Fièvre puerpérale des auteurs ;* elle a lieu lorſque le lait ne remplit point les mamelles & que la métaſtaſe eſt complète ſur le bas-ventre. La troiſième eſpèce, à laquelle M. *Doublet* donne le nom de *Fièvre puerpérale tardive*, eſt celle des Nourrices, où le lait quitte les mamelles dans leſquelles il s'étoit déjà ſéparé, & ſe porte ſur la cavité abdominale avec tous les ſymptômes des fièvres de la ſeconde eſpèce. A ces Obſervations nous ajouterons encore que M. *Doublet* a vu les vraies fièvres puerpérales, jugées tantôt par une bouffiſſure générale d'un blanc mat, qu'il appelle *anaſarque laiteuſe*, tantôt par une éruption de même nature, par des ſueurs abondantes, & des urines remplies d'un ſédiment laiteux conſidérable, qui continue à ſe ſéparer long-temps après la maladie ; enfin, dans quelques Malades, par une criſe mixte, compoſée d'une diarrhée & de quelques-unes des excrétions précédentes.

A l'égard des organes affectés, l'ouverture des cadavres a offert à ce ſujet des variétés conſidérables. M^rs. *Leake* & *Hulme* ont vu preſque toujours l'épiploon engorgé, ſuppuré, tombé même dans la région hypogaſtrique, les inteſtins enflammés & la matrice ordinairement intacte ;

ils ont conclu que ce dernier organe n'étoit pas affecté principalement, Mrs. *Johnſon & Johnſtone*, au contraire, ont vu la matrice enflammée ; & les obſervations de M. *Pouteau* paroiſſent d'accord avec les leurs. Les Obſervations de 1746 nous préſentent les inteſtins & la matrice affectés, mais ſur-tout ce dernier organe, dont les ovaires ont paru, dans quelques ſujets, être tombés en ſuppuration. Dans les obſervations de M. *Doulcet*, la matrice conſtamment intacte, ne paroît avoir ſouffert aucune altération.

Quant aux matières épanchées dans la cavité de l'*abdomen*, cette ſubſtance caſéeuſe, qui a été décrite dans les Obſervations de 1746, & dans celles faites depuis 1774, comme un véritable lait caillé, a été regardée par d'autres, comme une matière vraiment purulente ; & c'eſt ainſi que M. *de la Roche* l'a vu à Genève. Peut-être dans des maladies moins rapides & plus longues que n'ont été celles de l'Hôtel-Dieu, cette matière a-t-elle eu lieu de ſubir des altérations qui l'ont changée & rendue méconnoiſſable.

Mais ſans entrer à cet égard dans des diſcuſſions trop longues & qui demanderoient plus de recherches que nous en permettent le temps & les bornes preſcrites à ce Rapport, nous nous contenterons d'obſerver que le grand nombre de deſcriptions qui ont été faites de cette maladie, nous

la préſentent toutes avec deux caractères principaux ; l'un, d'une inflammation vive, annoncée par la tenſion & la douleur ; l'autre, d'une putridité que la foibleſſe & la petiteſſe du pouls, l'abattement des forces & la fétidité exceſſive des évacuations caractériſent évidemment. Plus ce dernier caractère a dominé, plus en général il paroît que cette maladie a été rapide & dangereuſe. Les Obſervations de Mrs. *Johnſon* & *Jonhſtone* & de M. *de la Roche*, nous la préſentent comme plus inflammatoire, & en même temps moins effrayante ; celles de Mrs. *White*, *Leake* & *Slaughter*, comme beaucoup plus putride & plus meurtrière. De quatre femmes qui, depuis le mois de Novembre juſqu'à celui de Février de cette année, l'ont éprouvée à l'Hoſpice de Vaugirard, trois ont eu un pouls foible, une proſtration de forces marquée & des évacuations très-fétides, & ſont mortes toutes trois. Une autre plus robuſte & dans laquelle les ſymptômes plus violens ont exigé pluſieurs ſaignées, eſt la ſeule qui s'en ſoit tirée heureuſement. Cet abattement qui caractériſe la putridité, eſt donc un des ſignes les plus fâcheux de cette maladie. C'eſt ſur-tout dans les Hôpitaux qu'elle a été obſervée telle, & elle n'a été nulle part, ni ſi promptement, ni ſi généralement funeſte qu'elle l'a paru à l'Hôtel-Dieu dans ces dernières années. Se complique-t-elle

alors

alors avec la fièvre d'Hôpital ! C'eſt le ſentiment de M. *White*.

C'eſt de cette complication différemment modifiée de putridité & d'inflammation qu'à dépendu en général la variété des méthodes ; variété qui a conſiſté ſur-tout dans la différente combinaiſon des ſaignées, & du régime anti-phlogiſtique avec les évacuans, les anti-putrides & les toniques. Nous n'entrerons pas dans les détails de chacune ; aucune n'eſt générale, & le choix n'en peut être déterminé que par les circonſtances ; mais nous obſerverons que ce ſont principalement les Médecins qui ont vu cette maladie avec le caractère le plus putride, qui ſe ſont le plus rapprochés de la méthode de M. *Doulcet*. On trouve les émétiques & les purgatifs ordonnés au commencement de la maladie dans les Ouvrages de Mrs. *Denman, Manning, Leake, White*, & *Slaughter*, & dans les Obſervations de M. *Doublet ;* M. *White* ſur-tout & M. *Denman* inſiſtent ſur l'uſage de l'ipécacuanha, non-ſeulement donné au commencement, mais répété pluſieurs fois & auſſi long-temps que les ſymptômes paroiſſent réſiſter à l'action des remèdes ; M. *Sigault* a obſervé que le tartre ſtibié & l'ipécacuanha ont fait revenir le lait aux mamelles, arrêté le dévoiement, & rétabli les lochies dans leur état naturel. L'exemple de ces derniers Médecins nous démontre encore que plus ceux qui ont ordonné les vomitifs, les

ont rapprochés du commencement de la maladie, plus auſſi ils ont eu de ſuccès dans le traitement des fièvres puerpérales putrides.

Cette méthode doit donc être employée, ſur-tout lorſque l'engorgement du ventre n'eſt pas encore fixé. Conviendra-t-elle alors dans tous les cas de fièvre puerpérale ! Préviendra-t-elle celle qui doit être plus inflammatoire & plus ardente, auſſi-bien que celles qui ſont compliquées avec la putridité & l'abattement des forces ? L'ipécacuanha doit-il avoir la préférence ſur les autres vomitifs ? Ce ſont des queſtions que l'expérience ſeule peut décider.

Quoi qu'il en ſoit, il eſt ſûr qu'une maladie auſſi prompte, auſſi généralement funeſte, que celle de l'Hôtel-Dieu, qui laiſſoit auſſi peu de temps à la réflexion, auſſi peu d'eſpoir au Médecin, guérie par une méthode auſſi ſimple que celle employée par M. *Doulcet*, & dont les ſuccès paroiſſent auſſi ſûrs & auſſi conſtans, eſt un de ces phénomènes rares qui font époque en Médecine, & que ce ſervice rendu à l'humanité ſouffrante, doit honorer à jamais la mémoire d'un Citoyen modeſte & vertueux, qu'une mort prématurée vient d'enlever aux juſtes témoignages de la reconnoiſſance publique. *Signé* DE LASSONE, GEOFFROY, LORRY, MAUDUYT, VICQ-D'AZYR, JEANROI, HALLÉ.

JE certifie que ce Rapport, fait par ordre du Gouvernement, sur un Mémoire contenant la méthode employée par feu M. Doulcet, *Docteur-Régent de la Faculté de Paris, & l'un des Médecins de l'Hôtel-Dieu, dans le traitement de la Fièvre puerpérale, est conforme à l'original qui a été lû dans la Séance tenue par la Société Royale de Médecine le 6 Septembre 1782. Au Louvre, le 8 Septembre 1782.* Signé *VICQ-D'AZYR, Secrétaire perpétuel.*

TABLE

Description sur la maladie des Femmes en couche, pag. 5.

Description de la Maladie, 8.

Progrès de la Maladie, 10.

Ouverture des Cadavres, 11.

Traitement indiqué par M. Doulcet, *& suivi du plus heureux succès*, 12.

Rapport fait par Ordre du Gouvernement, 21.

A ORLÉANS,

De l'Imprimerie de COURET DE VILLENEUVE, Imprimeur du Roi.